

ТЕЧЕНИЕ КАНДИДОЗНОЙ ИНФЕКЦИИ ГЕНИТАЛИЙ У ВИЧ ИНФЕКЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ

Джураев М.Г.

Андижанский Государственный медицинский институт Узбекистан, г. Андижан

Актуальность: ВИЧ-инфекция является опасным заболеванием, которое поражает мужчин и женщин любого возраста. Вирус иммунодефицита влияет на все звенья иммунной защиты как макрофаги, лимфоциты разных классов и другие клетки. Назначение препаратов этого ряда оправдано по причине большого числа возможных инфекций грибкового, бактериального и вирусного происхождения, присоединяющихся к ВИЧ-инфекции. У ВИЧ инфицированных больных нередко встречаются кандидозные поражения в виде беловатых творожистых наложений слизистой оболочки гениталий.

Цель: Оценка и сравнения эффективности фунгицидной терапии при кандидозной инфекции больных с ВИЧ инфекцией.

Методы исследования: Было проведено исследование эффективности фунгицидной терапии у ВИЧ-инфицированных лиц и больных СПИДом, обратившихся медицинской помощью по поводу кандидоза гениталий. В исследование было включено 22 пациента: 14 (63,6 %) женщин и 8 (36,3 %) мужчин в возрасте от 17 до 40 лет. Диагноз кандидоза ставился на основании клинических обследований. Терапия кандидозной инфекции проводилась нистатином, кетоконазолом и флуконазолом в виде мази и свечи.

Результаты: Обследованные больные часто жаловались на поражение слизистой оболочки различной локализацией в гениталиях. Клинические формы имели следующие структуры: вульвит – 28%, вульвовагинит – 52%, баланит – 12%, баланопостит - 8%. Выраженные изменения отмечались при снижении количества CD4 клеток ниже 200/мм. куб. Лечение было эффективным в подавляющем числе случаев и не имело побочных явлений. Эффективность лечения с учетом фунгицидной терапии составило: нистатин – 3 больных, кетоконазол – 8 больных, флуконазол – 11 больных.

Выводы: Результаты исследования свидетельствует о высокой эффективности фунгицидных препаратов, которые используются в современной практике лечения вторичных микозов при ВИЧ-инфекции. В настоящий момент антимикотическая терапия при ВИЧ-инфекциях не представляет определённых затруднений, исключая случаи фатальной абсолютной иммунодепрессии.